

100 jaar geleden

Uit het verslag van de Zesde Jaarvergadering, gehouden te 's-Gravenhage 21 en 22 mei 1898.

Huishoudelijke Vergadering, Zaterdagavond 21 mei 1898, in de Witte Sociëteit.

“Het eerste deel van het voorstel, om 2-maal 's jaars te vergaderen, wordt verworpen met 13 tegen 2 stemmen; het tweede gedeelte, om onderwerpen te doen inleideneveneens, met 12 tegen 1 stem, 1 in blanco”.

Commentaar: De in de laatste jaren weer actuele discussie over het aantal vergaderingen per jaar en de vraag of bepaalde onderwerpen speciale aandacht zouden moeten hebben, blijkt zo oud als de Vereniging zelf.

Wetenschappelijke Vergadering, Zondag 22 mei 1898

Ochtendbijeenkomst, in de Witte Sociëteit.

I. W. Posthumus Meyes. *Iets over de aetiologie van sommige van den neus uitgaande reflexneurosen*

“Wanneer wij bij een asthmalijder neuspolypen vinden, die verwijderen en den neus na de operatie vast tamponneeren, heeft het Spr. vaak getroffen dat, ondanks het door die tamponnade nog meer verstopt zijn van den neus en de volkomen opheffing der nasalen neusademhaling, de asthmaal-aanvallen uitbleven. Vindt men in casu geen polypen, doch innig contact van den neusschelp en septum door hypertrophie van het slijmvlies of spinae van het tussenschot, dan is het hem opgevallen, dat de asthmaal-aanval reeds aanstonds uitbleef, wanneer hij begon met de spina te verwijderen; daarentegen eer toenam als hij eerst de concha cauteriseerde”.

IV. H. Burger. *Demonstratie van RÖNTGEN-photographieën.*

“Spr. vertoont een aantal RÖNTGEN-photographieën, door Dr. MAX SCHEIER (Berlijn) aan de Vereeniging gezonden. Op sommige van deze photogrammen zijn de verschillende bijholten van de neus duidelij-

lijk te herkennen. Op de larynxphotogrammen ziet men o.a. duidelijk de ossificatie.”

“Spr. heeft indertijd aan een referaat over Scheiers eerste RÖNTGEN-publicatie de opmerking toegevoegd (Ned. Tijdschr. voor Geneesk. 1897, I, blz. 593) dat deze methode een middel moet zijn, om de nog steeds door sommigen bestreden mogelijkheid om de voorhoofdsholte te sondeeren, ad oculos te demonstree- ren.”

“Ook voor de physiologie van de spraak, met name de bewegingen van het palatum molle, is blijkens de photogrammen van SCHEIER het RÖNTGEN-onderzoek van belang.”

Commentaar: Röntgen maakte in december 1895 voor het eerst melding van de door hem gevonden X-stralen. In januari daarop volgde de eerste publicatie. De praktische toepassing van zijn revolutionaire vondst verliep zeer snel, ook in ons land. Gezien de enorme betekenis die het röntgenonderzoek in de KNO-Heelkunde in de afgelopen 100 jaar heeft gehad, moet de demonstratie van Burger als een historische gebeurtenis worden beschouwd.

Namiddagbijeenkomst in het Ooglijdersgesticht.

V. J.H. Reintjes. A. Demonstratie van een geval van glandula thyreoïdea accessoria van de tongbasis.

Pat., sigarenmaker van 25 jaar sprak sinds zijn kinderjaren “als of hij een aardappel in den mond had”. Voor 3 jaar gaf hij bloed op; de dokter vond toen de borst normaal.... Als hij zich aan abusos spirituosorum had schuldig gemaakt, gaf hij den volgenden dag bloed op. In Sept. j.l. kreeg hij, na de kermis, een bloeding, die 14 dagen aanhield. Eenige weken later ontdekte de dokter een gezwel op de tongbasis en verwees pat. naar Spr. Deze vond op de tongbasis een gezwel, dat de geheele breedte van de tong innam en de uvula naar boven duwde. Het had een middellijn van 3, een hoogte van 2 cM. Het was donkerbruin, elastisch, glad en bezet met dikke vaten. Wat was het? Een kyste was het niettegen een sarcoom pleitte het bestaan sedert de kinderjaren.

De bloedingen noopten tot verwijdering van het gezwel, waren tevens een contra-indicatie tegen excisie met het mes. Een lis was bij de breede basis van het gezwel niet te gebruiken. Spr. ging over tot electrolyse. Na 6 zittingen was het gezwel echter niet noemenswaard verkleind Opneming in het Wilhelmina-Ziekenhuis. (na hernieuwde bloeding) Hier kwam Dr. KOLFF naar aanleiding van VON CHAMISSO's "Die Struma der Zungenwürzel" op het denkbeeld, dat de tumor uit schildklierweefsel zou bestaan.

Op 29 maart werd de operatie verricht.

Onder narcose werd getracheotomiseerd, een TRENDELENBURG'sche canule ingebracht en het strot-

tenhoofd getamponneerd (*korte beschrijving van de operatie*) Bij de tracheotomie is gezocht of er iets van de schildklier te vinden was maar met negatief gevolg (*Bij 2 van de 13 gevallen van von Chamisso*) ... trad een postoperatoir myxoedeem op. Ditzelfde schijnt bij Spr.'s pat. ook reeds het geval te zijn. Hij krijgt iets gezwollens in het gezicht; bij het werk krijgt hij pijn in de rug hij is minder vrolijk Spr. hoopt aan pat. zijn vrolijkheid en gezondheid terug te kunnen geven door toediening van thyreoidpraeparaten. Het gezwel is door Prof. SIEGENBEEK VAN HEUKELOM onderzocht en verklaard te zijn schildklierweefsel.

E.H.Huizing